

51. *HYPHANTORNIS CABANISI* (Peters)?

Femelle.

52. *CORVUS SCAPULATUS* (Daud.). — Nom indigène : *Kounjouboui*.

Mâle.

53. *FRANCOLINUS* (*PTERNISTES*) *HUMBOLDTI* (Pet.). — Nom indigène : *N'koualé*.

Mâle. N° 162 Cat. voy. Bec, pattes, caroncules et yeux d'un rouge terne.

Le Muséum ne possédait pas encore d'exemplaire de cette espèce de Francolins, la seule de son genre que l'on trouve dans la région, selon M. Foa.

54. *NUMIDA EDOUARDI* (Hartl.). — Nom indigène : *Tanga-Tolé*.

Mâle et femelle. N° 173 et 174 Cat. voy. Peau de la tête d'un bleu turquoise; yeux, bec et pattes noirs. Espèce fort rare dans la région, où elle vit dans les taillis épais et sombres.

Les renseignements fournis par M. Foa serviront à élucider la question controuvée de la coloration des parties nues de la tête chez la *Numida Edouardi* et montreront peut-être que, sous ce nom, on a confondu deux espèces distinctes (voir O. Grant, *Cat. B. Brit. Mus.*, 1893, p. 232, note).

NOTE SUR DES MÉDUSES RAPPORTÉES PAR M. FOA
DU LAC TANGANYIKA ET DÉNOMMÉES LIMNOCNIDA TANGANYICÆ BÖHM,
PAR M. FÉLIX BERNARD.

Ces Coelentérés manquaient aux collections du Muséum. Les Méduses d'eau douce sont d'ailleurs des raretés : outre l'espèce en question, on n'en connaît qu'une seule, *Limnocodium Sowerbyi* Ray Lank., trouvée dans les bassin du Jardin botanique de Kew. L'espèce du Tanganyika a été découverte, en 1891, par M. Moir, et revue par un grand nombre de voyageurs, car elle est extrêmement abondante. Böhm lui donna un nom spécifique, et R. T. Günther en fit un genre nouveau, *Limnocrnida* (*Ann. Mag. Nat. Hist.* [6] XI, p. 269), et en présenta une étude très approfondie (*Quart. Journ. Micr. Sc.* [3], 1893). Ce travail est assez complet pour que je n'aie rien à y ajouter au point de vue anatomique ou histologique. Je rappelle que la Méduse en question est tout à fait remarquable par le diamètre énorme du *manubrium*, dont l'ouverture occupe les deux tiers de l'ombrelle, et reste extrêmement court. On trouve, sur le bord externe de ce manubrium, soit des cellules sexuelles, soit des bourgeons donnant des Méduses à divers états de développement.